

Kategória otázok: M2: Poľovnícka zoológia a biológia

V dokumente vidíme otázky so správnymi odpoveďami.

1. Podľa zákona o poľovníctve sa zver delí na dve hlavné skupiny:
 - zver srstnatú a zver pernatú
2. Pod pojmom zver sa rozumie:
 - populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 1 zákona o poľovníctve
3. Pod pojmom malá zver sa rozumie:
 - zver bažantia, zajačia a jarabičia
4. Pod pojmom zver raticová sa rozumie:
 - daniel škvritný, diviak lesný, jeleň lesný, jeleň sika, kamzík vrchovský alpský, kamzík vrchovský tatranský, los mokrad'ový, muflón lesný, jeleník (pasrnec) bielochovej, srnec lesný a zubor hrivnatý
5. Zver podliehajúca poľovníckemu plánovaniu:
 - zver raticová, zver malá a jariabok lesný
6. Pod pojmom veľké šelmy sa rozumie:
 - medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý a šakal zlatý
7. Pod pojmom krkavcovité vtáky sa rozumie:
 - havran čierny, kavka tmavá, krkavec čierny, vrana túlavá východoeurópska a západoeurópska, straka čiernozobá a sojka škriekavá
8. Hmotnosť dospelých husí sa pohybuje v rozpätí:
 - od 2,8 do 4,5 kg u guňára, od 2 do 3,8 kg u husí
9. Hmotnosť dospelých kačíc sa pohybuje v rozpätí:
 - od 0,8 do 1,3 kg
10. Kačica divá znáša:
 - od polovice marca do polovice apríla 8 až 14 olivovo zelených vajíčok na ktorých sedí len kačica 26 dní
11. Z radu zúbkozobce (Anseriformes) má pre poľovníctvo význam čeľaď:
 - kačicovitá, podčeľaď kačice a podčeľaď husí
12. Kráľčica zver pohlavne dospieva:
 - už v roku, v ktorom sa narodila, t.j. vo veku 5 – 6 mesiacov, takže rané mláďatá sa môžu ešte v tom istom roku honcovať
13. Pokiaľ ide o hlasové prejavy, kráľčica zver sa ozýva:
 - tichým mrmlaním pri pastve a honcovaní, kvílením, vrešťaním či pišťaním v úzkosti a nebezpečenstve
14. Systematické zaradenie svišťá vrchovského v poľovníckej zoológii je:

- rad: hlodavce, čeľaď: vevericovité, druh: svišť vrchovský
15. Zafarbenie srsti svišť'a vrchovského (*Marmota marmota*) je:
 - hnedošedé so žltkastým nádychom, vrchná časť hlavy a koniec chvosta sú čierne
 16. Celková dĺžka tela dospelého svišť'a je až:
 - 60 cm
 17. Celková hmotnosť dospelého svišť'a dosahuje:
 - 4 – 8 kg
 18. Svišť vrchovský žije:
 - polygamne v menších rodinných alebo i väčších kolóniách a v podzemných norách siahajúcich do hĺbky 2 m a so vstupnou chodbou až 20 m dlhou
 19. Zimné obdobie prečkáva svišť vrchovský:
 - v tzv. pravom zimnom spánku a tento po celé zimné obdobie (6,5 – 7 mesiacov) neprerušuje
 20. Svišť vrchovský je veľmi ostrážitý a v prípade nebezpečenstva alebo znepokojenia sa ozýva typickým:
 - ostrým varovným hvizdom
 21. Dĺžka gravidity u samice svišť'a trvá:
 - 5 – 6 týždňov
 22. Systematické zaradenie ondatry v poľovníckej zoológii je:
 - rad: hlodavce, čeľaď: hrabošovité, druh: ondatra pižmová
 23. Sfarbenie srsti ondatry pižmovej (*Ondatra zibethica*) je:
 - hrdzavohnedé až šedohnedé, spodná časť tela je šedohnedá až žltohnedá
 24. Pôvodnou domovinou ondatry pižmovej je:
 - Severná Amerika
 25. Hmotnosť dospelaj ondatry pižmovej dosahuje:
 - 0,9 – 1,6 kg
 26. Ondatra pižmová žije:
 - okolo stojatých aj tečúcich vôd monogamne v pároch alebo rodinách
 27. Význam ondatry pižmovej spočíva:
 - vo veľmi kvalitnej kožušine (bizam)
 28. Rad: Mäsožravce (*Carnivora*) sa vyznačuje predovšetkým týmito charakteristickými spoločnými znakmi:
 - majú chrup, zodpovedajúci potravinovej špecializácii, so silnými špičiakmi a stoličkami, telo majú prispôsobené rýchlemu pohybu, nemajú kľúčnu kosť, majú výborne vyvinuté zmysly, hlavne zrak, čuch a sluch, vrhajú nevidiace

mláďatá, ktoré si vyžadujú značnú starostlivosť rodičov a v ich spoločenskom živote hrajú významnú úlohu pachové žľazy

29. Systematické zaradenie medveďa (*Ursus arctos*) v poľovníckej zoológii je:
 - rad: mäsožravce, čeľaď: medveďovité, druh: medveď hnedý
30. Celková hmotnosť dospelých kusov medveďa hnedého sa pohybuje medzi:
 - 170 – 340 kg u medveďov a 120 – 240 kg u medveďíc
31. Pokiaľ ide o spôsob života, medveď hnedý žije:
 - samotársky, len medvedice v rodinkách s medvied'atami, o ktoré sa stará až do 2 rokov ich veku
32. Zo zmyslov má medveď hnedý najlepšie vyvinutý:
 - čuch a sluch, zrak má slabší
33. Doba párenia medveďa hnedého prebieha:
 - v máji až júli, prípadne aj v auguste
34. Zimné obdobie prechádza medveď hnedý:
 - v nepravom zimnom spánku, tzn. že spánok prerušuje za účelom vyprázdnenia a doplnenia tekutín
35. Dĺžka gravidity u medvedice je:
 - 7 – 9 mesiacov vzhľadom k obdobiu latentnej gravidity
36. Medvedica vrhá vo februári a marci:
 - 2 – 3 medvied'atá o hmotnosti 0,4 kg , ktoré sú 30 dní slepé
37. Systematické zaradenie vlka (*Canis lupus*) v poľovníckej zoológii je:
 - rad: mäsožravce, čeľaď: psovité, druh: vlk dravý
38. Celková hmotnosť dospelých vlkov sa pohybuje medzi:
 - 40 – 65 kg u vlka a 25 – 45 kg u vlčice
39. Pokiaľ ide o spôsob života, vlk žije:
 - monogamne v rodinách, a to od jari do jesene, pričom začiatkom zimy sa k rodine pridružujú mladé vlky z predošlého vrhu a žijú až do jari vo svorke
40. Zo zmyslov má vlk najlepšie vyvinutý:
 - čuch a sluch, zrakom sa orientuje len na kratšiu vzdialenosť
41. Doba párenia vlkov prebieha:
 - v januári až marci
42. Dĺžka gravidity u vlčice je:
 - 62 – 65 dní, t.j. asi 9 týždňov
43. Vlčica vrhá:

- v máji až júni 3 – 8 vlčat, ktoré sú 10 – 12 dní slepé a cicajú po dobu 5 – 6 týždňov
44. Systematické zaradenie líšky (*Vulpes vulpes*) v poľovnickej zoológii je:
 - rad: mäsožravce, čeľaď: psovité, druh: líška hrdzavá
 45. Pokiaľ ide o spôsob života, líška hrdzavá žije:
 - polygamne, okrem obdobia párenia a starostlivosti o mláďatá, samotársky
 46. Zo zmyslov má líška hrdzavá výborne vyvinutý:
 - čuch, sluch i zrak
 47. Pachové žľazy líšky hrdzavej, ktoré sú dôležité v období párenia (kankovania) a pri vymedzovaní teritória, sa nachádzajú.
 - nad koreňom chvosta (tzv. fialka), na prstových vankúšikoch a v okolí prirodzených otvorov tela
 48. Kankovanie líšok prebieha:
 - v januári a februári
 49. Dĺžka gravidity u líšky hrdzavej je:
 - 51 – 54 dní
 50. Líška hrdzavá vrhá v apríli až v máji v nore, ktorú si sama vyhrabáva:
 - 3 – 8 a niekedy aj viac líščat, ktoré sú asi 14 dní slepé
 51. Systematické zaradenia psíka medvedíkovitého (*Nyctereutes procyonoides*) v poľovnickej zoológii je:
 - rad: mäsožravce, čeľaď: psovité, druh: psík medvedíkovitý
 52. Zafarbenie srsti psíka medvedíkovitého je:
 - hnedé so šedým až načernalým nádychom, hlava je svetlošedá s predĺženou srst'ou vytvárajúcou v lícnej časti biele pruhy do strán
 53. Celková dĺžka tela psíka medvedíkovitého sa pohybuje medzi:
 - 50 – 70 cm
 54. Celková hmotnosť tela psíka medvedíkovitého sa pohybuje medzi:
 - 4 – 6 kg, na jeseň 8 – 10 kg
 55. Pokiaľ ide o spôsob života, psík medvedíkovitý žije:
 - v pároch alebo rodinách a je aktívny za súmraku a v noci
 56. Zimné obdobie prechádza psík medvedíkovitý:
 - v nepravom zimnom spánku, ktorý prerušuje
 57. Párenie u psíka medvedíkovitého prebieha:
 - marec – apríl

58. Čeľad' mačkovité (Felidae) z radu mäsožravce sa vyznačujú predovšetkým týmito charakteristickými spoločnými znakmi:
- majú krátku, oblúkovito vyklenutú guľatú lebku s veľkými očnicami, majú výborný zrak, umožňujúci lov za súmraku a v noci, ostré zatiahnuteľné pazúry, umožňujúce uchopenie koristi
59. Systematické zaradenie mačky divej (*Felis silvestris*) v poľovníckej zoológii je:
- rad: mäsožravce, čeľad': mačkovité, druh: mačka divá
60. Zafarbenie srsti mačky divej je:
- šedo hnedé s hnedočiernymi alebo čiernymi pruhmi, ktoré smerom ku chrbtu tmavnú, spodná časť tela je svetlejšia, špinavo šedá, koniec chvosta je širší, akoby guľatý a čierny, počet pruhov až prstencov na chvoste je 4 – 5
61. Celková hmotnosť dospeljej mačky divej sa pohybuje medzi:
- u kocúra 8 – 14 kg, u mačky 5 – 9 kg
62. Zo zmyslov má mačka divá najlepšie vyvinutý:
- zrak a sluch, čuch je veľmi slabý
63. Pokiaľ ide o spôsob života, mačka divá žije:
- samotársky, okrem obdobia kankovania (kedy sa dá pozorovať viacero kocúrov na jednom mieste) a starostlivosti o mláďatá, pričom je aktívna za súmraku a v noci, cez deň len v období starostlivosti o mláďatá
64. Kankovanie (ruja) u mačky divej prebieha:
- vo februári až marci
65. Dĺžka gravidity u mačky divej je:
- 63 dní
66. Mačka divá vrhá v apríli až júni:
- 3 – 6 mačiat, ktoré sú prvých 10 – 12 dní slepé
67. Systematické zaradenie rysa (*Lynx lynx*) v poľovníckej zoológii je:
- rad: mäsožravce, čeľad': mačkovité, druh: rys ostrovid
68. Zafarbenie srsti rysa ostrovida je:
- hrdzavohnedé alebo hrdzavošedé s nepravidelnými hnedočiernymi škvrnami, konce ušnic sú zakončené čiernymi štetinami, po stranách hlavy je predĺžená svetlejšia belavá srst' v tvare bokombrady, krátky chvost je na konci hnedočierny až čierny
69. Celková hmotnosť dospelého rysa sa pohybuje medzi:
- 17 – 35 kg
70. Zo zmyslov má rys najlepšie vyvinutý:
- zrak a sluch, čuch je veľmi slabý
71. Ak ide o spôsob života, rys ostrovid žije:

- okrem doby kankovania a starostlivosti o mláďatá samotársky vo vlastnom vymedzenom teritóriu a je aktívny za súmraku a v noci, vo dne len v období starostlivosti o mláďatá
72. Kankovanie (ruja) u rysa ostrovida prebieha:
- od februára do začiatku apríla
73. Dĺžka gravidity u rysice je:
- 70 – 74 dní
74. Rysica vrhá v máji až začiatkom júna:
- 2 – 4 rysíčatá, ktoré sú prvých 14 dní slepé
75. V potrave rysa jednoznačne prevláda:
- srnčia zver, zajac poľný
76. Čeľaď kunovité, predtým lasicovité (Mustelidae) z radu mäsožravce, sa vyznačuje predovšetkým týmito charakteristickými spoločnými znakmi:
- majú štíhle, pretiahnuté telo a sploštenú hlavu, významné sú u nich paraanálne pachové žľazy, ktoré plnia aj obrannú funkciu, živia sa prevažne živočíšnou potravou, pričom jej množstvo a druh ovplyvňuje ich rozmnožovanie, t.j. dĺžku gravidity, počet vrhov aj mláďat, žijú väčšinou samotársky a skrytým spôsobom života
77. Systematické zaradenie vydry (*Lutra lutra*) v poľovníckej zoológii je:
- rad: mäsožravce, čeľaď: kunovité (predtým lasicovité), druh: vydra riečna
78. Vydra riečna je prispôbena stavbou a tvarom tela životu vo vode, k čomu využíva:
- plávacie blany medzi prstami na všetkých končatinách, uzavierateľné nozdry a ušné otvory, ako aj výborný zrak a hmatové fúzy po stranách pysku a nad očami
79. Pokiaľ ide o spôsob života, vydra riečna žije:
- samotársky skrytým spôsobom života s prevažne nočnou aktivitou, pričom si svoje teritórium značkuje trusom a zvyškami rýb, ktoré sú jej hlavnou potravou
80. Systematické zaradenie jazveca (*Meles meles*) v poľovníckej zoológii je:
- rad: mäsožravce, čeľaď: kunovité (predtým lasicovité), druh: jazvec lesný
81. Sfarbenie srsti jazveca lesného je:
- šedo žlté, hlava je bledo šedá s 2 čiernymi pruhmi cez oči, spodná časť tela a končatiny sú čierne, chvost je šedo biely, srst' je hrubá, štetinovitá
82. Celková hmotnosť dospelého jazveca sa pohybuje medzi:
- 11 – 20 kg u jazveca a 6 – 15 kg u samice, pričom na jeseň je hmotnosť výrazne vyššia ako na jar
83. Pachová žľaza jazveca lesného, ktorú používa pri značkovaní svojho teritória, sa nachádza:
- pod chvostom

84. Zo zmyslov má jazvec najlepšie vyvinutý:
- zrak a sluch, čuch je pomerne slabý
85. Krátke končatiny jazveca sú vybavené silnými pazúrami, slúžiacimi na hrabanie, ktoré na:
- predných končatinách sú dlhšie ako na zadných a majú dĺžku až 5 cm
86. Párenie (chrutie) u jazveca lesného prebieha:
- dosť nepravidelne, a to od konca apríla až začiatku mája do augusta
87. Dĺžka gravidity u jazvečice je:
- 7 – 8 mesiacov, z toho asi 5 mesiacov je latentná gravidita
88. Jazvečica vrhá vo februári až marci:
- 3 – 5 mláďat, ktoré sú lysé a 4 – 5 týždňov slepé
89. Pokiaľ ide o spôsob života, jazvec lesný žije:
- v pároch a rodinách až do ďalšej ruje, pričom sa aj vzájomne často navštevujú
90. Zimné obdobie prečkáva jazvec lesný so značnými tukovými rezervami:
- v 3 – 4 mesačnom nepravom zimnom spánku, tzn. že spánok prerušuje za účelom vyprázdňovania
91. Systematické zaradenie kún v poľovníckej zoológii je:
- rad: mäsožravce, čeľaď: kunovité (predtým lasicovité), druh: kuna lesná / kuna skalná
92. Zafarbenie srsti kuny lesnej (*Martes martes*) je:
- hnedé s tmavším lesklým nádychom na chrbte, na krku má žltú škvrnu (náprsenku), ktorá sa nerozdvojuje na predné končatiny
93. Zafarbenie srsti kuny skalnej (*Martes foina*) je:
- svetlohnedé s nádychom do šeda, na krku má bielu náprsenku, ktorá sa vidlicovito rozvetvuje na prednú plochu hrudníkových končatín
94. Pokiaľ ide o spôsob života, kuny žijú:
- okrem obdobia párenia a starostlivosti o mláďatá samotárskym spôsobom života v loveckom teritóriu, ktoré si značkujú, kuna lesná výlučne v lese a kuna skalná spravidla v blízkosti ľudských obydlií, pričom oba druhy sú aktívne hlavne v noci
95. Obdobie párenia kún prebieha:
- v júli a auguste
96. Dĺžka gravidity u kuny je:
- 9 mesiacov, z toho 6 mesiacov pripadá na latentnú graviditu
97. Zo zmyslových orgánov kuny majú najlepšie vyvinutý:
- čuch, sluch a zrak

98. Kuny vrhajú mláďatá:
- v apríli až máji, 2 – 6 mláďat, ktoré asi 5 týždňov sú nevidiace
99. Systematické zaradenie tchorov v poľovníckej zoológii je:
- rad: mäsožravce, čeľaď: kunovité (predtým lasicovité), druh: tchor tmavý / tchor svetlý
100. Zafarbenie srsti tchora tmavého (*Mustela putorius*) je:
- hnedé až tmavohnedé, hrud', boky, končatiny a chvost sú tmavšie až do čiernej, podsada je žltkastá až belavá, prúžok nad očami a okraje ušnic sú svetlé
101. Obdobie párenia u tchorov je:
- v marci a v apríli
102. Dĺžka gravidity u samice tchora je:
- 40 – 43 dní
103. V živote tchorov majú značný význam paraanálne žľazy, ktoré slúžia k:
- značkovaniu loveckého územia a majú tiež obranný mechanizmus v prípade nebezpečenstva, kedy tchor vypúšťa nárazovite silno zapáchajúcu tekutinu, tzv. „tchorovinu“, čím odpudzuje a zastrahuje protivníka
104. Systematické zaradenie lasice myšozravce (*Mustela nivalis*) v poľovníckej zoológii je:
- rad: mäsožravce, čeľaď: kunovité (predtým lasicovité), druh: lasica myšozravá
105. Systematické zaradenie hranostaja v poľovníckej zoológii je:
- rad: mäsožravce, čeľaď: kunovité (predtým lasicovité), druh: hranostaj čiernochvostý
106. Zafarbenie srsti hranostaja čiernochvostého (*Mustela erminea*) je:
- v letom období škoricovo hnedé, krk, brucho a vnútorné plochy končatín sú belavé až biele, koniec chvosta je čierny, v zimnom období je biele, len koniec chvosta ostáva čierny
107. Dĺžka tela dospelých lasíc sa pohybuje medzi:
- hranostaj 21 – 29 cm, lasica 15 – 25 cm
108. Kelce sa u srnčej zveri:
- vyskytujú výnimočne a sú slabé a dosť sploštené
109. Pučnice vyrastajú mladému srnčekovi:
- už vo 4. mesiaci života a dorastajú v 5.- 6. mesiaci života
110. Po ukončení rastu pučníc začína na nich mladému srnčekovi vyrastať prvé parožie
- jeho rast býva dokončený v 7.-9. mesiaci života a má spravidla tvar paličiek o dĺžke okolo 2 cm
111. Prvé parožie (parôžky), majúce tvar paličiek vytĺka mladý srnček:

- v januári až februári nasledujúceho roku a krátko na to koncom februára, začiatkom marca ich zhadzuje
112. Srnček s prvým parožíom sa nazýva:
- paličkár
113. Prvé parožie (parôžky) mladého srnčka:
- už má strechovité ružice, môže mať vetvenie a slabé perlenie
114. Po zhodení prvého parožia tvaru paličiek nasadzuje srnec ihneď druhé parožie, ktoré dorastie:
- v máji až začiatkom júna a vytĺka ho v júni až začiatkom júla a zhadzuje koncom novembra až decembra
115. Srnec s druhým parožíom býva spravidla:
- špičiak a len zvlášť dobre založený srnec nasadzuje parožky vidláka alebo šestoráka
116. V 3. roku života a nasledujúcich rokoch nasadzuje srnec parožie:
- minimálne vidláka a dobre založený srnec stupeň šestoráka, pričom tento stupeň obyčajne už neprekračuje i keď vzácne dochádza i k bohatšiemu vetveniu parôžkov, napr. osmoráka, či dokonca desatoráka
117. Dospelý srnec vytĺka parôžky v:
- koncom marca a apríli a zhadzuje v októbri a novembri
118. Najčastejším tvarom srnčieho parožia je stupeň:
- šestoráka
119. Tvar srnčieho parožia je daný:
- založením srnca, t.j. dedičnosťou
120. Vek živej srnčej zveri možno odhadnúť:
- podľa celkového vzhľadu a držania tela, tvaru hlavy, šírky nosnej škrvny, šírky krku, podľa doby prefarbovania a vytĺkania a tiež podľa chovania v čriede
121. Vek ulovenej srnčej zveri zisťujeme pomerne spoľahlivo, a to podľa:
- vývoja a stupňa opotrebovania chrupu, najmä stoličiek
122. Doba ruje u jeleníka (pasrnca) bielochového prebieha od:
- konca októbra až do novembra (prevažne však v novembri)
123. Jeleník (pasrnec) bielochový v dobe ruje:
- nezhrmažďujú okolo seba jelenice, ale ich na značnú vzdialenosť vyhľadávajú
124. Priebeh ruje u jeleníka (pasrnca) bielochového:
- pripomína srnčiu ruju
125. V čase ruje má jeleník (pasrnec) bielochový pri sebe spravidla:

- 1 laň, ktorú opúšťa po dobe jej ruje a vyhľadáva inú doposiaľ neoplodnenú jelenicu
126. Pôvodnou domovinou (areálom) jeleňa siku je:
- východná Ázia (Ďaleký východ a Japonsko)
127. Veľkosťou a letným sfarbením srsti sa jeleň sika Dybowského na prvý pohľad podobá:
- danielovej zveri
128. Sfarbenie srsti v letnom období (s výnimkou melanotických jedincov) je u jeleňa siky japonského spravidla:
- sýto gaštanovo červené až žltkasto hnedé s drobnými bielymi škvrnami
129. Typickým znakom jeleňa siku japonského, a to ako v letnom, tak i v zimnom osrstení je:
- dlhý chvost
130. Ďalším výrazným znakom, a to u oboch poddruhov jeleňa siku v zimnom osrstení je:
- bohatá, veľmi výrazná hriva, najmä na jej spodnej strane
131. Počet a umiestnenie pachových žliaz, ktoré majú značný význam v spoločenskom a rodinnom živote jeleňov sikov sú:
- podobné ako u jelenej zveri
132. Jeleň sika pohlavne dospieva:
- už v 2. roku života, aktívne sa však zúčastňujú ruje jelenice, jelene až v 3. roku života, a to len v miestach, kde je nedostatok starších jeleňov
133. Doba ruje a jej dĺžka je u jeleňa siku:
- pomerne dlhá a môže prebiehať od polovice septembra do decembra, hlavné obdobie ruje sa však približne kryje s rujou danielovej zveri
134. Ruji jeleňa siku predchádza:
- tvorba väčších rujných čried holej zveri, k nim sa pripájajú aj jelene
135. Rujoviskom jeleňa siku býva najčastejšie:
- hustejšie porasty (mladiny) a žrdoviny
136. Los európsky ako najmohutnejšia parohatá zver môže dosiahnuť v dospelosti 9 – 10 rokov hmotnosť až:
- 500 kg (najčastejšie do 400 kg)
137. Losica dosahuje v dospelosti okolo 7. roku života až:
- 350 kg
138. Tetrov hlucháň sa vyznačuje:
- nápadným pohlavným dimorfizmom (dvojtvárnosťou)
139. Hmotnosť tetrove hlucháňa sa pohybuje:
- 2,5 – 5,5 kg u kohúta a 1,5 – 3,0 kg u sliepky

140. Zafarbenie sliepky tetrova hlucháňa je:
- hrdzavohnedé, tmavo priečne škvrnité
141. Obľúbeným biotopom tetrova hlucháňa sú:
- staré ihličnaté lesy na hrebeňoch hôr
142. Pokiaľ ide o spôsob života tetrov hlucháň žije:
- polygamne a pri sliepkach sa zdržuje len v období toku
143. Tok tetrova hlucháňa prebieha na tokaniskách v období od:
- marca do konca mája a to v závislosti na počasí a nadmorskej výšky
144. Tok tetrova hlucháňa začína ráno pred svitaním charakteristickým spevom a ktorý sa skladá z:
- 4 sloh a to klepkania, trilkovania, vylusknutia a brúsenia
145. Sliepka tetrova hlucháňa v apríly a máji znáša:
- 6 – 10 hnedých vajec s tmavými škvrnami
146. Tetrov holniak sa vyznačuje:
- nápadným pohlavným dimorfizmom v zafarbení
147. Hmotnosť tetrova holniaka dosahuje:
- 1,2 – 1,6 kg u kohúta a 0,8 – 1,0 kg u sliepky
148. Zafarbenie sliepky tetrova je:
- hrdzavohnedé s tmavohnedými priečnymi pásikmi, zobák tmavohnedý
149. Pokiaľ ide o spôsob života tetrov holniak žije:
- polygamne a k sliepkam sa pripája len v období toku
150. Obľúbeným životným prostredím (biotopom) tetrova holniaka sú:
- okraje hôr, rúbaniská, lesné čistinky, vresoviská a rašeliniská
151. Tok tetrova holniaka prebieha:
- od polovice marca do konca mája, tok prebieha na zemi
152. Kohút tetrova holniaka počas toku vzdáva hlas označovaný ako:
- šuškanie s následným zreteľným bublaním
153. Sliepka tetrova holniaka znáša spravidla:
- 6 až 12 vajčiek bleďožltej farby s hrdzavohnedými škvrnami, liahnutie po 25 dňoch
154. Hmotnosť dospelého jariabka hôrneho dosahuje:
- 0,35 – 0,5 kg
155. Pokiaľ ide o spôsob života jariabka hôrneho žije:
- monogamným spôsobom života, v ihličnatých a zmiešaných lesoch

156. Na rozdiel od sliepočky má kohútik jariabka hôrneho:
- na hlave chocholček a na brade výraznú bielo olemovanú čiernu škvrnu
157. Tok u jariabka hôrneho prebieha od:
- od polovice marca do konca apríla, na zemi alebo na spodných konároch stromov
158. Jariabky hôrne sa párikujú:
- na jeseň od začiatku septembra do konca októbra
159. Sliepočka jariabka hôrneho znáša od polovice marca do konca apríla do hniezda na zemi:
- 7 až 10 vajíčok belavej farby s tmavými škvrnami
160. Na rozdiel od tetrovitých (lesných kurovitých vtákov) majú bažantovité vtáky:
- neoperené beháky a rohovité výrastky na prstoch im chýbajú
161. Základné sfarbenie obidvoch pohlaví jarabice poľnej je:
- vrch tela sivohnedý, spodok hnedosivý s množstvom škvrn vlniek a pásikov
162. Kohútik jarabice poľnej na rozdiel od sliepočky má:
- na krídlových krovkách len pozdĺžny svetlý pás pri osi pera
163. Hmotnosť dospelaj jarabice poľnej sa pohybuje v rozpätí:
- od 0,35 – 0,45 kg
164. Pokiaľ ide o spôsob života jarabica poľná žije:
- monogamne v pároch v priebehu odchovej sezóny a až udrie zima spájajú sa do krdlikov
165. Párikovanie u jarabice poľnej nastáva:
- v zime koncom februára a začiatkom marca
166. Hmotnosť dospelého bažanta poľovného sa pohybuje medzi:
- 1,1 až 2,0 kg u kohúta, 0,8 až 1,4 kg u sliepky
167. Sliepka bažanta poľovného má sfarbenie:
- hnedé až sivohnedé viac-menej zemito s jarabou kresbou
168. Beháky u bažanta poľovného sú:
- neoperené a nad zadným prstom u kohúta je ostroha, ktorá sliepkam chýba
169. Vek u bažanta poľovného (kohúta) na výrade určujeme:
- podľa ostrohy, u dospelého kohúta je dlhšia a ostro zakončená, u mladého krátka a tupá
170. Pokiaľ ide o spôsob života bažant žije:
- polygamne (1 kohút s 3 – 4 sliepkami), spoločne sa zdržujú len v priebehu toku

171. Tok jarabice poľnej prebieha:
- od konca marca do konca apríla, keď sa jarabice celý deň ozývajú čiríkaním a páriky si vymedzia teritória
172. Sliepka jarabice poľnej znáša spravidla do konca apríla:
- 12 až 18 jednofarebných sivých, prípadne hnedosivých až olivovo hnedých vajíčok do plytkej jamky na zemi
173. Sliepočka jarabice poľnej sedí na vajíčkach:
- 23 – 25 dní sama
174. Vek jarabice poľnej na výrade určujeme:
- podľa zakončenia prvej a druhej veľkej ručnej letky a sfarbenia behákov
175. Mladé jarabičky poľné na výrade majú:
- ostré zakončenie prvej a druhej veľkej ručnej letky a žlté sfarbenie beháka
176. Pôvodnou domovinou bažantov je oblasť:
- juhozápadný Kaukaz, východná Ázia a Japonsko
177. Bažant poľovný sa vyznačuje:
- výrazným pohlavným dimorfizmom (v sfarbení)
178. Tok bažanta poľovného prebieha od:
- konca marca do polovice mája, ale pri náhradnej znáške až do konca júna
179. Sliepka bažanta znáša:
- 10 až 16 olivovo zelených vajíčok a ktorých sedí 23 – 24 dní
180. Sliepka bažanta si zakladá hniezdo:
- na zemi v plytkej jamke, ktorú len slabo vystiela kúskami rastlín a perín prevažne v travinách a burinách
181. Pôvodnou domovinou morky divej je:
- severná Amerika
182. Sfarbenie oboch pohlaví morky divej je:
- tmavo sivé až čierne s prímiesou hnedej a bronzovým leskom
183. Hmotnosť dospelých moriek divých je:
- 9 až 12 kg u moriaka a 5 až 6 kg u morky
184. Sfarbenie lysky čiernej v oboch pohlaviach je:
- čierne s bielou lysinou na čele a bielym zobákom
185. Hmotnosť dospelej lysky čiernej je:
- 0,6 kg až 0,9 kg
186. Pokiaľ ide o spôsob života lyska čierna je:
- sťahovavý chriaštel'otvarý vták, ktorý žije monogamne v pároch

187. Tok lysky čiernej prebieha:
- po prilete zo zimovísk, spravidla v polovici marca
188. Drop fúzatý je najväčším stepným vtákom:
- Európy
189. Hmotnosť dospelého dropa fúzatého sa pohybuje od:
- 12 do 18 kg u kohúta a od 5 do 8 kg u sliepky
190. Sliepka dropa fúzatého znáša:
- väčšinou 2 až 3 vajcia na ktorých sedí len sliepka 24 – 25 dní
191. Sfarbenie sluky lesnej je:
- na chrbte hrdzavohnedé, na temene hlavy má priečne tmavé pruhy a na brušnej strane žltkasto hnedé
192. Hmotnosť sluky lesnej sa pohybuje medzi:
- 0,2 až 0,4 kg
193. Pre sluku lesnú je charakteristický:
- dlhý zobák 71 až 78 mm a pomerne krátke nohy
194. Tok sluky lesnej prebieha na jarnom ťahu približne od:
- polovice marca do konca apríla
195. Sluka lesná sa sťahuje do zimovísk v Stredomorí:
- v septembri a októbri
196. Pokiaľ ide o spôsob života čajky smejivej je:
- sťahovavý vták, žijúci monogamne v pároch na okrajoch vodných plôch v kolóniách
197. Hus divá po prilete zo zimovísk znáša:
- 4 až 8 bielych vajec, na ktorých sedí len húska približne 28 dní, pričom o mláďatá sa stará aj gunár
198. Pokiaľ ide o spôsob života hus divá je:
- monogamní druh, ktorý žije v trvalých pároch vytvorených z mladých jedincov na jeseň a ktoré zotrvávajú spolu po celý život
199. Rad dravce, čiže dravé vtáky rozdeľujeme do troch čeľadí:
- sokolovité, jastrabovité, kršiakovité
200. Z čeľade jastrabovitých u nás žijú tieto druhy:
- jastrab veľký, jastrab krahulec, myšiak lesný, myšiak severský, včelár lesný, haja tmavá, haja červená, kaňa močiarna, kaňa sivá, kaňa popolavá, kaňa stepná, orol skalný, orol kráľovský, orol krikľavý, orol malý, orliak morský a hadiar krátkoprstý

201. Čriedu jeleníc vedie:
- vedúca jelenica, spravidla skúsený, kondične silný jedinec stredného veku s jelenčat'om
202. Čriedu jeleňov vedie:
- najmladší jeleň
203. Čriedu jelenice opúšťajú jedine:
- pri kladení mlád'at ale skoro sa do nej aj s mlád'at'om vracajú
204. Čriedy jeleňov sa pred rujou:
- rozpadajú
205. Zo zmyslov má jelenia zver najdokonalejšie vyvinutý:
- čuch a sluch
206. Jelenie sa v priebehu ruje ozývajú:
- hlbokým hrdelným ručaním
207. Podľa intenzity ručania jeleňou hovoríme:
- hlasitej alebo tichej ruji
208. Tichá jelenia ruja prebieha:
- za teplého počasia ale hlavne pri nedostatku dospelých jeleňov
209. Jelenia zve, samčia i samičia pohlavne dospieva:
- už v druhom roku života
210. Ruja u jelenej zveri spravidla prebieha:
- od 10. septembra do 10. októbra
211. Dospelý starší jeleň má:
- širokú hlavu s lalokom pod bradou, hrubý a tým vizuálne kratší krk, mohutné prsia, výrazný kohútik, krátke nohy, hrubý trup a previsnuté brucho
212. Vek jeleňa v revíri určujeme podľa:
- celkového vzhľadu tela – postavy
213. U jelenej zveri výmena mliečneho chrupu za trvalý je ukončená vo veku:
- 30 mesiacov
214. Samcom jelenej zveri vyrastajú na hlave parohy, ktoré:
- každoročne zhadzuje a znovu nasadzuje
215. Paroh jelenej zveri je:
- kosný útvar
216. Parohy jelenej každoročne vyrastajú z:
- pučnic

217. Pučnice vyrastajú mladému jeleníkovi už:
- v 6 mesiaci života, sú trvalé a s vekom hrubnú
218. Po ukončení rastu pučníc mladému jeleňovi narastie prvé parožie vo veku:
- 14 mesiacov
219. Jeleňa s prvým parožím nazývame:
- ihličiak
220. Kmeň, hlavná os jelenieho parohu má tieto časti:
- ružicu, ryhy, perly, vetvy
221. Prvá vetva nad ružicou na kmeni jelenieho parohu sa nazýva:
- očnica
222. Druhá vetva nad očnicou na kmeni jelenieho parohu sa nazýva:
- nadočnica, ktorá u niektorých jedincov môže chýbať
223. Tretia vetva nad nadočnicou na kmeni jelenieho parožia sa nazýva:
- stredná vetva
224. Štvrtá vetva na kmeni jelenieho parohu nad strednou vetvou, resp. medzi strednou vetvou a korunou, ktorá sa započítava do koruny sa nazýva:
- vlčia vetva (vlčník)
225. Kmeň jelenieho parohu môže byť zakončený:
- ihlicovite, vidlicou alebo korunou
226. Korunou označujeme koniec kmeňa jelenieho parohu, keď je:
- kmeň zakončený min. tromi vetvami
227. Podľa tvaru poznáme korunu:
- jednoduchú, dvojité (dvoj etážová), trojitá (trojetažová)
228. Rozšírenú časť kmeňa jelenieho parožia tesne nad pučnicou nazývame:
- ružica
229. Jeleň, ktorý má na každom kmeni rovnaký počet vetiev sa nazýva:
- pravidelný
230. Vek ulovenej jelenej zveri zisťujeme pomerne spoľahlivo podľa:
- podľa vývoja a opotrebovania chrupu, hrúbky (šírky) a výšky pučníc
231. Pôvodnou domovinou danielovej zveri je:
- predná a malá Ázia
232. Čriedu danielov vedie:
- najsilnejší dospelý daniel a postavenie v čriede nestráca ani po zhodení parožia
233. Čriedu danielic vedie:

- vedúca danielica, ktorá je najostražitejšia, najskúsenejšia a zároveň i vodiaca danielica
234. Daniela zver je najčastejšie sfarbená:
- svetlo hrdzavé s bielymi škvrnami po tele a tmavým pásom na chrbte, ktorý siaha až na chvost, v zime je sivohnedý bez výrazných škvŕn
235. Zo zmyslových orgánov u danieler zveri je najlepšie vyvinutý:
- čuch a sluch
236. Základom čriedy bezparohatej zveri je:
- materská skupina t. j. danielica, danielča, danielička (šmolka)
237. Dospelá danielia zver dosahuje hmotnosť od:
- 50 do 90 kg daniel a od 40 do 55 kg danielica
238. Daniela ruja trvá:
- od 5. októbra do začiatku novembra
239. Danielice sa aktívne zúčastňujú ruje už:
- v 2. roku života
240. Dospelé danieler v priebehu ruje:
- sa neustále ozývajú chrapľavým hrdelným chrkaním
241. Daniel v priebehu ruje sa správa tak, že:
- nevyhľadáva danielice, naopak rujné danielice a danieličky prichádzajú na rujovisko za danielom
242. Danielica je gravidná:
- 32 týždňov a spravidla v júni rodí zvyčajne 1, niekedy 2 danielčatá s hmotnosťou 4,0 – 4,3 kg, ktoré cicajú 3 – 4 mesiace
243. Hmotnosť dospeljej muflonej zveri je:
- 40 až 55 kg muflón, 30 až 40 kg muflónka
244. Zo zmyslov má muflonia zver najlepšie vyvinutý:
- výborný zrak, čuch a sluch tak dobrý ako u ostatnej raticovej zveri
245. Duté rohovitú tuľajky u muflóna sú:
- derivátom kože, keď koža na báze rohových kostí postupne rohovie
246. Muflonia ruja prebieha od:
- konca októbra do začiatku decembra
247. Gravidita u muflónky trvá:
- 22 týždňov a rodí 1 až 2 muflónčatá s hmotnosťou 1,7 – 3,4 kg
248. Vek baranov u muflónej zveri v revíri odhadujeme:
- podľa mohutnosti tela a tuľajok, veľkosti bielej tvárovej masky

249. Vek ulovených muflónich baranov na chovateľskej prehliadke určujeme:
- podľa ročných prírastkov, resp. širokých a úzkych vrúbkov na tuľajke
250. Kamzík vrchovský tatranský je:
- pôvodným druhom našej fauny
251. Kamzík vrchovský alpský je:
- nepôvodným (introdukovaným) druhom
252. Hmotnosť kamzičej zveri je od:
- 30 do 45 kg u kamzíka, od 25 do 35 u kamzice
253. Zo zmyslov má kamzičia zver najlepšie vyvinutý:
- výborný zrak, dobrý čuch, sluch ale i hmat v oblasti pyskov
254. Ruja u kamzičej zveri prebieha od:
- začiatku novembra do polovice decembra
255. Gravidita u kamzice trvá:
- 180 až 190 dní a kamzica vrhá najčastejšie 1 zriedka 2 kamzičatá
256. Kamzičia zver žije:
- v čriedach oddelených podľa pohlavia a starí kamzici samotársky
257. Medzi hlasové prejavy kamzičej zveri patrí:
- mečanie podobné koziemu, nárek pri napadnutí predátorom a hvizd ako ostrý varovný signál upozorňujúci na nebezpečenstvo
258. Rozdiel v tvare rožkov medzi kamzíkom a kamzicou je:
- u kamzíka sú na báze silnejšie a viac hákovito zahnuté
259. Živá hmotnosť dospelaj diviačej zveri je od:
- 120 až 250 u kanca (výnimočne cez 300 kg) a 80 až 150 kg u diviačice (výnimočne do 200 kg)
260. Zo zmyslov je u diviačej zveri najlepšie vyvinutý:
- čuch a sluch, zrak je slabší
261. Letná srst' diviačej zveri je na rozdiel od zimnej:
- riedka a krátka, svetlejšia čiernosivá, hnedosivá a sivá, bez podsady, na chrbte riedke štetiny
262. Pohlavná dvojtvárnosť (dimorfizmus) u dospelaj diviačej zveri:
- je už dobre viditeľná u lanštiakov, podľa tvaru a mohutnosti lebky a strapca
263. Výmenná mliečneho chrupu za trvalý je u diviačej zveri ukončená približne:
- v 24 mesiaci života
264. Očné zuby diviakov – kancov tzv. kly:

- nie sú zakončené koreňom a preto neustále dorastajú
265. Očné zuby diviačice – bachyne tzv. háky sú:
- nápadne kratšie a slabšie, takmer nevyčnievajúce z rypáka a sú zakončené úzkym otvorom do zubnej dutiny
266. Párenie, poľovnícky chrutie u diviačej zveri prebieha spravidla od:
- novembra do konca januára
267. Diviačica pokiaľ je optimálna veková štruktúra v populácii sa parí:
- vo veku 18 – 20 mesiacov, t. j. v druhom roku života, pri dostatku potravy už v 8 – 10 mesiaci, t. j. v prvom roku života
268. Dĺžka gravidity u diviačice trvá:
- 114 – 118 dní, t. j. 3 mesiace, 3 týždne a 3 dni
269. Diviačica rodí, poľovnícky vrhá:
- 3 až 8 diviačat, výnimočne 10 až 12 diviačat
270. Čriedu diviačej zveri vždy vedie:
- spravidla najstaršia a najskúsenejšia vodiaca diviačica, len v období párenia na jej konci sa zdržujú kance
271. Počas roka diviačia zver žije prevažne:
- vo väčších čriedach, ktoré pozostávajú z materských skupín, ktoré tvoria vodiace diviačice, ich diviačatá a ich vlašajšie potomstvo – lanštiaky, pričom lanštiaky samčieho pohlavia po dosiahnutí pohlavnej zrelosti sú z čriedy vyhnané
272. Charakteristickým znakom čelade zajacotvarých sú:
- nápadne dlhšie a silnejšie zadné nohy (štvorprsté) ako kratšie predné nohy (päťprsté) zakončené ostrými pazúrami
273. Dospelý zajac poľný dosahuje priemernú hmotnosť:
- 4 kg
274. Zo zmyslových orgánov u zajaca poľného je najlepšie vyvinutý:
- sluch, pričom čuch podľa ktorého sa orientuje na kratšiu vzdialenosť a zrak sú slabšie
275. Zajac poľný žije:
- prevažne nočným, samotárskym a polygamným spôsobom
276. Obdobie párenia, poľovnícky honcovania zajaca poľného začína v našich podmienkach:
- za miernych zím už na začiatku januára a končí v auguste
277. Dĺžka gravidity u zajačice poľnej trvá:
- 42 – 44 dní

278. V priebehu odchovnej sezóny zajačica poľná vrhne:
- 11 až 12 mláďat
279. Zajačica poľná vrhá mláďatá:
- osrstené a vidiace do plytkej jamky na zemi
280. Pôvodnou domovinou králika divého (*Oryctolagus ciniculus*) je:
- stredomorská oblasť severnej Afriky
281. Hmotnosť dospelého králika divého sa pohybuje medzi:
- 1,3 – 2,2 kg, v priemere 1,5 kg
282. Králik divý žije:
- prevažne nočným spôsobom života, polygamne v mnoho početných kolóniách, na ľahkých piesočnatých pôdach kde si vyhrabáva hlboké a členité nory od ktorých sa veľmi nevzdialuje
283. Párenie, poľovnícky honcovanie u králika divého prebieha:
- podľa počasia, spravidla už začiatkom februára a trvá nepretržite do jesene
284. Dĺžka gravidity u králičice divej trvá:
- 28 až 32 dní
285. Pokiaľ ide o počet mláďat v našich podmienkach králičica rodí, poľovnícky vrhá:
- 5 až 6 vrhov, v priemere 4 až 8 mláďat, ktoré sú nevidiace a holé
286. Z čeľade holubotvarých sa u nás vyskytujú:
- hrdlička záhradná, hrdlička poľná, holub hrivnák a holub plúžik
287. Hmotnosť holuba hrivnaka je:
- 0,35 až 0,65 kg
288. Z čeľade holubotvarých medzi sťahovavé druhy patria:
- hrdlička poľná, holub hrivnák a holub plúžik
289. Pre čeľaď holubotvaré je charakteristické:
- v priebehu odchovnej sezóny znášajú 2 až 3 krát po dve biele vajcia na ktorých sedia 14 – 17 dní
290. Charakteristické znaky kormorána veľkého sú:
- veľký čierny vták s hnedým nádychom a bielou kresbou na hlave o hmotnosti 1,7 až 2,6 kg, hniezdi v kolóniách na vysokých stromoch, živý sa prevažne rybami a je sťahovavý
291. Charakteristické znaky volavky popolavej sú:
- na chrbte popolavý až modrosivý, hlava a krk sú biele, hmotnosť 1 – 2 kg, medzi prstami chýbajú plávacie blany, hniezdi na stromoch často v kolóniách, ale aj jednotlivo, živí sa prevažne rybami, obojživelníkmi, hmyzom a je sťahovavým vtákom

292. Charakteristické znaky drozda čvikoťavého sú:
- má sivú hlavu, záhlavie, chvost a krovky, čím sa odlišuje od ostatných drozdov, hmotnosť sa pohybuje od 90 do 110 gramov, je sťahovavým vtákom
293. Charakteristické znaky krkavca čierneho sú:
- má celé telo čierne, pomerne veľký kovovolesklý zobák a klinovitý chvost, hniezdi na stromoch a skalách, žije monogamne a v zime sa zhľukuje do menších krdľov, je stálym vtákom
294. Charakteristické znaky medvedíka čistotného sú:
- varom ohnutého chrbta pripomína mačku, tvárová časť je svetlá s priečnym tmavým pruhom cez oči, má dlhšiu srst', chvost sivý s čiernymi obrúčkami, hmotnosť do 22 kg, patrí medzi nepravých zimných spáčov
295. Charakteristické znaky zubra hrivnatého sú:
- ajväčší európsky cicavec z čeľade turovitotvarých, je celý tmavohnedý s pomerne jemnou, na prednej časti tela predĺženou srst'ou, rohy sú krátke a vytočené do hora, dospelý býk dosahuje hmotnosť do 1 300 kg,